

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Uretroplastika u ženy

Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu

Striktura (zúžení) močové trubice


Popis zdravotního výkonu

Účelem tohoto zdravotního výkonu je rekonstrukce (plastika) močové trubice s cílem odstranit její zúžení, přerušení či nahradit chybějící část, v kterékoli místě, a tím odstranit potíže s močením či obnovit schopnost močit.


Zdravotní výkon bude probíhat takto

Po přípravě (oholení, podání nízkomolekulárního heparinu, podání antibiotik), v celkové anestezii, v poloze na zádech, s dolními končetinami zavěšenými tak, aby byla přístupná oblast zevního genitálu, resp. poševního vchodu, tzv. gynekologická poloha je přístup k močové trubici zjednán řezem nad jejím zevním ústím, ve tvaru U, s vrcholem směrem ke klitoris. Močová trubice s jejím zúžením je obnažena a vytažena z oblasti pod stydkou kostí. Tím je zpřístupněno zúžení, které je na zadní straně (blíže ke klitoris) protnuto až do zdravé části na obou koncích. Do otevřené močové trubice je vložena záplata buď z dutiny ústní (z oblasti tváře, oblasti dolního rtu) nebo z přední stěny poševní. Záplata je ve svém uložení fixována pokračovaným stehem. Poté je močová trubice uložena a fixována zpět do své původní polohy, na závěr je sešita operační rána mezi ústím močové trubice a klitoris.

Je zaveden permanentní katetr na dobu 2-3 týdnů do močové trubice. Moč může být odváděna i další cévkou zavedenou v podbřišku, přes stěnu do močového měchýře, pokud tak již nebylo učiněno před operací. Po celou dobu jsou podávána antibiotika. Před odstraněním permanentního katetru se provádí RTG vyšetření.



Obrázek 1



Obrázek 2

Možná rizika doporučeného zdravotního výkonu

Byla jsem dále poučena, že lékařem doporučený výkon má následující rizika:

Krvácení v oblasti operace, bezprostředně po výkonu, dále možnost infekce a komplikovaného hojení s ovlivněním výsledku operace, možnost močové píštěle, tedy komunikace mezi močovou trubicí a pochvou, s únikem moče pístělí v průběhu močení

Mezi další, spíše pozdní komplikace patří recidiva zúžení v 5-30 %, v závislosti na rozsahu plastiky a její lokalitě. Vzácnou komplikací výkonu může být tromboembolická příhoda, zhoršení interního či neurologického stavu, v závislosti na věku a přidružených chorobách.

Kromě uvedených komplikací může během výkonu dojít k dalším vzácným komplikacím. Komplikace mohou vést k nutnosti operačního výkonu, hospitalizace a další léčby, ve velmi vzácných případech až k trvalému postižení nebo úmrtí pacienta. Pacientka si dále uvědomuje, že provedením zdravotního výkonu nemusí být dosaženo očekávaného výsledku.

Poučení o případných alternativách shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu, jejich přednostech, rizicích:

Byla jsem poučena, že jako alternativa místo shora lékařem uvedeného a doporučeného výkonu je možné provést v případech, kdy se jedná o zúžení močové trubice tyto zákroky:

Optická uretrotomie

Indikace je dána stavem onemocnění

Vzala jsem na vědomí, že tato alternativa má oproti lékařem doporučenému výkonu tyto *výhody*:

Menší invazivita (výkon probíhá bez řezu, endoskopicky, přístrojem zavedeným do močové trubice)

Ale současně tyto *nevýhody*:

Nízká účinnost

Dilatace močové trubice

Vzala jsem na vědomí, že tato alternativa má oproti lékařem doporučenému výkonu tyto *výhody*:

Menší invazivita

Ale současně tyto *nevýhody*:

Potřeba provádět dilatace až do konce života

Předpokládaná doba hospitalizace: zpravidla 1 týden

Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného výkonu, lze-li takové předpokládat:

Po dobu zavedení cévky, zvýšená hygiena, péče o katetr, do zhojení sexuální abstinence. V závislosti na charakteru práce, pracovní neschopnost 3 týdny, výjimečně déle.

Souhlas nemocné s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byla lékařem úplně a srozumitelně poučena o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byla jsem poučena i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měla možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědoma všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byla jsem poučena o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměla a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacientky.....

Rodné číslo pacientky.....

V Jihlavě dne: **Podpis pacientky**.....

Podpis lékaře.....