

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Opakované dispenzární uretrocystoskopické vyšetření při diagnostikovaném nádorovém onemocnění močového měchýře - UCSK

U pacientů s diagnostikovaným nádorovým onemocněním jsou v rámci dispenzární péče doporučeny pravidelné cystoskopické kontroly močového měchýře. Provádí se zpravidla 2 roky po stanovení diagnózy a 3 měsíce, pak podle nálezů lze intervaly prodloužit.

Provádí se obvykle v takzvané litotomické či gynekologické poloze, tedy v poloze na zádech s pokrčenými a roztaženými dolními končetinami.

Po dezinfekci zevního ústí močové trubice a následné aplikaci znečítlivujícího gelu se do močové trubice postupně zavádí endoskop neboli cystoskop /flexibilní či rigidní/ až do močového měchýře a posuzuje se vzhled sliznice a stěny močové trubice a močového měchýře a zhodnocuje se možná patologie.

U žen i mužů lze tento zákrok provést ambulantně ve slizniční anestezii / není nutné interní předoperační vyšetření/. Na přání pacienta však lze tento zákrok provést i v celkové či svodné anestezii, avšak již za krátkodobé hospitalizace s nutností interního předoperačního vyšetření.

Délka trvání tohoto vyšetření je několik minut, vyšetření nebývá příliš bolestivé, ale spíše nepříjemné, zejména u mužů vzhledem k délce močové trubice.

Po výkonu je třeba dodržovat pitný režim a klidový režim minim. 24 hodin. Pokud by 24 hodin po výkonu přetrvávaly potíže jako pálení a řezání při močení, bolesti, krvácení a zvýšené teploty, dostavte se k akutnímu ošetření či kontrole na urologii.

Alternativní postup, který by plně nahradil cystoskopické vyšetření neexistuje.

Komplikace po tomto výkonu nejsou příliš časté ani závažné. Jde většinou o pocity řezání a pálení v močové trubici, ojediněle může nastat krvácení z močové trubice či prostaty. Obtíže většinou během několika hodin odezní. Jiné komplikace, jako například zvýšená teplota či zástava močení jsou vzácné, po výkonu může nastat zánět dolních močových cest / zánět močové trubice s následným vznikem zúženiny, zánět močového měchýře, i mužů pak i zánět prostaty, varlat a nadvarlat /. Pokud není zánět dolních cest močových včas léčen, může dojít k rozvoji zánětu i na horní cesty močové /ledviny/ s následným rozvojem celkové infekce organismu, tzv. sepse.

K těmto komplikacím přistupujeme s preventivním opatřením u rizikových pacientů. Komplikace se při výskytu dají vždy řešit.

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:.....

Rodné číslo pacienta:.....

V Jihlavě dne: Podpis pacienta:.....

Podpis lékaře:.....